


Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal

1

Bedöm livstecken, larma och starta HLR 30:2



2

Hämta defibrillator och akututrustning Larma larmgrupp

Primärvård, tandvård med flera - larma 112

3

Starta defibrillatorn, följ råden Anslut defibrilleringselektroder under pågående HLR



Defibrillera
HLR 2 min
Minimera avbrott

Analysera
hjärtrytmen

Defibrillera inte
HLR 2 min
Minimera avbrott

Återkomst av spontan cirkulation (ROSC) Utvärdera enligt ABCDE

TÄNK PÅ!

- Syrgas 10 l/min
- Två-livräddarteknik
- Hårt underlag om möjligt
- Ta hand om närstående

Fortsätt HLR till patienten visar tydliga livstecken eller larmgruppen tar över ansvaret.

BARN

När barn drabbas av hjärtstopp beror det oftast på att de inte kunnat andas. Starta med 5 inblåsningar därefter HLR 15:2. Utför kompressioner med ett djup som motsvarar 1/3 av bröstkorgens höjd. Anslut defibrillator under pågående HLR.

Till barn under 8 år bör barnelektroder eller ett särskilt barnläge användas. Finns inte detta används vuxenelektroder och vuxenläge.

